

Mettre en place un traitement sélectif au tarissement

**100 %
du troupeau**

Etape 1

Réformer les
animaux à
problèmes

➔ Réformer après palpation mammaire (sur pis vide)



Pis déséquilibré



Absès



Induration

Etape 2

Trier les brebis
infectées
grâce au CCI

Comptage cellulaire (CCI) lors du dernier contrôle
ou dans le dernier mois de traite

Brebis saine	Brebis douteuse	Brebis infectée
Tous ses résultats < 300 000 cell/ml* (sauf mise à l'herbe)	Résultat 1 fois > 300 000 cell/ml*	2 résultats > 800 000 cell/ml

* Seuils exprimés avec étalon international certifié en vigueur au 1er avril 2021

Ou test plateau (CMT) si pas de possibilité de CCI

➔ Traiter toutes les brebis infectées et douteuses:
le seuil auquel traiter est à adapter à chaque élevage
(statut de l'élevage, nombre de CCI, ...)

Etape 3

Optionnelle

Trier les fortes
productrices

**10 à 25 %
des brebis
traitées**

En prévention des infections après tarissement

➔ Traiter les quelques brebis forte productrices
(valeur génétique)



GDS
Tarn

Sources & photos : « Maitrise
cellulaire du troupeau », CNBL